



Xilema o Tronco leñoso en Zanahorias



Entre los meses de octubre a febrero se pueden presentar en las zanahorias características morfológicas particulares que se denominan “Tronco leñoso o Xilema leñoso”. Este tejido vegetal transporta líquidos, sales minerales y otros nutrientes desde la raíz a las hojas, aumentando su grosor y con esto provocando en el centro de la zanahoria una rama leñosa, similar a madera que podría confundirse con un elemento extraño.

Los proveedores en esta época refuerzan sus medidas de control, como la revisión y retiro de aquellas zanahorias que presentan un tronco leñoso más grueso, antes de entrar al picado (cubo o juliana) o en zanahoria entera, sin embargo, por la naturaleza de sus productos no es factible asegurar la completa ausencia de éstos. Según lo anterior, la posibilidad de aparición de este tejido vegetal es advertida en la ficha técnica de las zanahorias preprocesadas.

¿Qué debemos hacer?



Aumentar los controles en la etapa de limpieza de verduras, según lo indicado en el **POE 5D - LIMPIEZA DE VERDURAS PREPROCESADAS POR PROVEEDORES**, eliminando los posibles elementos extraños que se puedan encontrar.



Registrar los procesos de revisión (con o sin hallazgos) en el registro **R-04 PRESENCIA DE ELEMENTOS EXTRAÑOS EN MATERIAS PRIMAS**.



Asegurar el abastecimiento de las materias primas desde proveedores referenciados por el área de compras de Sodexo.